

# ***Una manera distinta de defenderse contra la destrucción de las plaquetas***

**TAVALISSE es un medicamento que se toma por vía oral, que puede ayudarlo a controlar la púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI) crónica al proteger las plaquetas del sistema inmunitario.**

## **¿Qué es TAVALISSE?**

TAVALISSE es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con recuentos bajos de plaquetas a causa de la PTI crónica cuando un tratamiento anterior para la PTI no ha funcionado lo suficientemente bien. Se desconoce si TAVALISSE es seguro y eficaz en niños.

**Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.**

 **Tavalisse™**  
(fostamatinib disodium  
hexahydrate) tablets

**“ Me siento más reticente a conocer personas nuevas porque tengo muchos moretones con mucha frecuencia ”**

**— Paciente que vive con PTI crónica**

## **La PTI crónica puede ser una afección grave**

**Si no se controla de manera adecuada, la PTI crónica puede generar sangrado excesivo y otras complicaciones.**

### **¿Qué es la PTI?**

La PTI crónica es una enfermedad autoinmunitaria, por la cual el propio sistema inmunitario del cuerpo ataca y destruye las plaquetas en la sangre. Las plaquetas se necesitan para ayudar a formar coágulos y detener el sangrado.

Las personas con PTI crónica tienen recuentos bajos de plaquetas, lo cual puede producir sangrado excesivo y otras complicaciones.

**El objetivo del tratamiento para la PTI crónica es reducir el riesgo de sangrado.**

### **¿Qué ocurre cuando usted tiene recuentos bajos de plaquetas?**

Cuando los recuentos de plaquetas son bajos, el cuerpo no puede producir un coágulo para detener el sangrado. Esto puede provocar moretones, sangrado y la posibilidad de eventos de sangrado graves. El cuerpo de cada persona es único; por lo tanto sus síntomas de PTI crónica pueden ser distintos.

En general, los proveedores de atención médica consideran el tratamiento cuando los recuentos de plaquetas son inferiores a 30,000 por microlitro o cuando los pacientes tienen recuentos bajos de plaquetas y experimentan síntomas.

**Elevar los recuentos de plaquetas para evitar el sangrado excesivo es clave para controlar la PTI crónica.**

# Un abordaje novedoso para tratar la PTI crónica

**TAVALISSE funciona de una manera distinta a otros tratamientos para la PTI crónica con los cuales usted puede estar familiarizado.**

## ¿Cómo se trata la PTI crónica?

Las terapias actuales para la PTI crónica elevan los recuentos de plaquetas y reducen el riesgo de sangrado excesivo de una de estas dos maneras:

Algunas terapias estimulan la médula ósea para producir más plaquetas.

**PRODUCIR  
MÁS  
PLAQUETAS**

O  
BIEN

**INTERRUMPIR  
LA DESTRUCCIÓN  
DE PLAQUETAS**

Algunas terapias suprimen el sistema inmunitario para aminorar la destrucción de plaquetas, que es la causa subyacente de la enfermedad.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

### ¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de TAVALISSE?

**TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La aparición de presión arterial alta, o el empeoramiento de la ya existente, es común en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial con regularidad durante el tratamiento con TAVALISSE. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede ponerle un tratamiento con medicamentos para la presión arterial o cambiar sus medicamentos actuales para tratar la presión arterial. Hable con su proveedor de atención médica si tiene dolores de cabeza, confusión, mareos, dolor de pecho o falta de aliento.
- **Problemas hepáticos.** Los cambios en los resultados de análisis de sangre para verificar la función hepática son comunes con TAVALISSE. Es posible que se manifiesten problemas hepáticos, los cuales pueden ser graves. Durante el tratamiento con TAVALISSE, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para verificar el funcionamiento del hígado.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.

## ¿Cómo funciona TAVALISSE para tratar la PTI crónica?



TAVALISSE limita la destrucción de plaquetas por parte del sistema inmunitario para elevar los recuentos de plaquetas en el cuerpo y ayudar a reducir el riesgo de sangrado grave



TAVALISSE específicamente apunta a la tirosina cinasa del bazo (spleen tyrosine kinase, SYK), una parte importante de la vía que lleva a la destrucción de las plaquetas. TAVALISSE funciona de manera distinta a otros tratamientos.



TAVALISSE es el primero y único tratamiento oral que funciona de este modo para tratar la PTI crónica en adultos.

**TAVALISSE apunta a una parte del sistema inmunitario que lleva a la destrucción de las plaquetas.**

**Hable con su médico para determinar si es adecuado para usted.**

**Tavalisse™**  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# Ayude a controlar sus niveles de plaquetas

En estudios clínicos, TAVALISSE ha demostrado que eleva los recuentos de plaquetas con el tiempo.

## ¿Qué resultados se pueden esperar de tomar TAVALISSE?

En un estudio de 150 adultos con PTI crónica, TAVALISSE se comparó con placebo (una píldora de azúcar) a fin de determinar su efectividad para elevar los recuentos de plaquetas durante un período de 6 meses. Todos los pacientes del estudio tenían al menos un tratamiento anterior, como corticoides, inmunoglobulinas, rituximab, un agonista del receptor de trombopoyetina y/o esplenectomía. Los pacientes que se beneficiaron de TAVALISSE respondieron al fármaco independientemente del tratamiento anterior.



Un subgrupo de pacientes, aquellos con una respuesta estable\* a TAVALISSE, lograron una mediana de recuento de plaquetas de alrededor de 97,000 por microlitro al final del estudio de 6 meses. La mediana inicial de recuento de plaquetas para estos pacientes fue de 16,000 por microlitro.

\*La respuesta estable en el ensayo clínico se definió como un recuento de plaquetas superior o igual a 50,000 por microlitro para 4 (o más) visitas al médico durante los 3 últimos meses del estudio de 6 meses.



Muchos pacientes que tuvieron una respuesta positiva con TAVALISSE, tuvieron un aumento en sus recuentos de plaquetas en su primer control (aproximadamente 2 semanas).

Su proveedor de atención médica controlará los recuentos de plaquetas y realizará cualquier ajuste necesario que sea adecuado para usted.



En un ensayo clínico en curso, la duración de la respuesta se mantuvo durante más de 2 años en más de la mitad de los pacientes que respondieron.†

†Estimación de la duración mediana de respuesta.

**Su proveedor de atención médica controlará sus recuentos de plaquetas, supervisará la presencia de posibles efectos secundarios y podrá realizar ajustes a su tratamiento para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.**

**El cuerpo de cada persona es único; por lo tanto usted puede responder a TAVALISSE de manera distinta.**

## ¿Cuánto tiempo tendré que tomar TAVALISSE?

TAVALISSE es un medicamento que usted toma a diario, como se le recete. Su proveedor de atención médica le aconsejará que continúe tomando TAVALISSE en tanto mantenga sus recuentos de plaquetas y usted responda bien a la terapia.

La PTI es una afección crónica; por lo tanto es importante que tome TAVALISSE todos los días para manejar sus recuentos de plaquetas, aunque comience a sentirse mejor. Si es necesario realizar cambios en su dosis o sus medicamentos, su proveedor de atención médica analizará esto con usted.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

### ¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de TAVALISSE? (cont.)

**TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

- **Diarrea.** La diarrea es común en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Hable con su proveedor de atención médica si tiene diarrea durante el tratamiento con TAVALISSE. Su proveedor de atención médica puede recomendarle cambios en la dieta, beber más agua o medicamentos para limitar estos síntomas.
- **Disminuciones en el recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** Las disminuciones en el recuento de glóbulos blancos son comunes con TAVALISSE y pueden ser graves. Esto puede aumentar el riesgo de infección, incluidas infecciones graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para verificar los recuentos de glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis, interrumpirla temporalmente o suspender el tratamiento con TAVALISSE de manera permanente si usted tiene efectos secundarios.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.



# El beneficio de un medicamento por vía oral

## TAVALISSE no tiene restricciones dietéticas.

### ¿Cómo debo tomar TAVALISSE?



Disponible en dos concentraciones de dosis, 100 mg y 150 mg



Medicamento por vía oral dos veces al día



Se puede tomar con o sin alimentos

En función de su respuesta a la terapia, su proveedor de atención médica encontrará el cronograma de tratamiento adecuado para usted. Debe tomar TAVALISSE exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

### ¿De qué manera mi proveedor de atención médica controlará mi respuesta?

Su proveedor de atención médica comprobará su recuento de plaquetas, hemograma completo, incluido el recuento de glóbulos blancos, pruebas de la función hepática y presión arterial durante su tratamiento con TAVALISSE y podrá cambiar su dosis de TAVALISSE según sea necesario.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.

### ¿Qué más debo conocer sobre tomar TAVALISSE?

Si olvida tomar una dosis de TAVALISSE, tome su siguiente dosis a su hora programada de manera regular. Si toma demasiada cantidad de TAVALISSE, llame de inmediato a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano.



*Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome*, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados medicamentos puede afectar el funcionamiento de los otros medicamentos y los otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de TAVALISSE. Conozca los medicamentos que toma. Tenga una lista de ellos y muéstrese la a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.

### ¿Cómo debo guardar los comprimidos de TAVALISSE?

- Guarde TAVALISSE a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C).
- El frasco de TAVALISSE contiene 2 cápsulas desecantes para mantener el medicamento seco. No quite las cápsulas desecantes del frasco.

**Mantenga TAVALISSE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

**Tavalisse™**  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# Incorpore TAVALISSE a su estilo de vida

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

Antes de tomar TAVALISSE, hable con su proveedor de atención médica sobre sus problemas médicos, incluido si usted:

- tiene presión arterial alta
- tiene problemas hepáticos
- está embarazada o planea quedar embarazada. TAVALISSE puede dañar a su bebé en gestación.
  - Su proveedor de atención médica comprobará si usted está embarazada antes de comenzar el tratamiento con TAVALISSE.
  - Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con TAVALISSE y durante al menos 1 mes después de la última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados medicamentos puede afectar el funcionamiento de TAVALISSE y el de los otros medicamentos.

## ¿Cuáles son algunas de las maneras de ayudarme a recordar que debo tomar mi medicamento?

Es importante que tome TAVALISSE todos los días, como se lo haya recetado su proveedor de atención médica. Crear una rutina diaria ayudará a que TAVALISSE sea una parte habitual de su estilo de vida. A continuación se detallan algunos consejos para empezar. Encuentre el método que mejor funcione para usted.



**Aproveche la tecnología.** Puede establecer una alarma diaria en su teléfono celular. O bien, puede usar un teléfono inteligente que le proporcione alertas cuando sea la hora de tomar su medicamento. Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles también pueden enviar mensajes de texto, correos electrónicos y otros recordatorios para ayudarlo a llevar cuenta de su cronograma de administración de dosis.



**Combine la toma del medicamento con una actividad diaria.** Puede asociar la toma de su medicamento con una rutina diaria como lavarse los dientes o prepararse para ir a dormir.



**Haga participar a otros familiares o amigos.** Puede haber otras personas en su círculo de apoyo que estarían dispuestos a recordarle que tome su medicamento. Identifique a las personas que conoce y haga un plan que funcione para usted.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.

Mi diario de tratamiento fue diseñado para ayudarlo a incorporar TAVALISSE en su estilo de vida, controlar su progreso y mantenerse al día.

Asegúrese de compartir la información que registre en este diario con su proveedor de atención médica en cada cita.



Descargue este diario de tratamiento en **TAVALISSE.com**

**Tavalisse™**  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

# Comprender los posibles efectos secundarios

Su médico le explicará los posibles efectos secundarios comunes y graves relacionados con TAVALISSE, y le proporcionará consejos sobre qué debe hacer si los experimenta.

## ¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de TAVALISSE?

TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La aparición de presión arterial alta, o el empeoramiento de la ya existente, es común en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial con regularidad durante el tratamiento con TAVALISSE. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede ponerle tratamiento con medicamentos para la presión arterial o cambiar sus medicamentos actuales para tratar la presión arterial. Hable con su proveedor de atención médica si tiene dolores de cabeza, confusión, mareos, dolor de pecho o falta de aliento.
- **Problemas hepáticos.** Los cambios en los resultados de análisis de sangre para verificar la función hepática son comunes con TAVALISSE. Es posible que se manifiesten problemas hepáticos, los cuales pueden ser graves. Durante el tratamiento con TAVALISSE, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para verificar el funcionamiento del hígado.
- **Diarrea.** La diarrea es común en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Hable con su proveedor de atención médica si tiene diarrea durante el tratamiento con TAVALISSE. Su proveedor de atención médica puede recomendarle cambios en la dieta, beber más agua o medicamentos para limitar estos síntomas.
- **Disminuciones en el recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** Las disminuciones en el recuento de glóbulos blancos son comunes con TAVALISSE y pueden ser graves. Esto puede aumentar el riesgo de infección, incluidas infecciones graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para verificar los recuentos de glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis, interrumpirla temporalmente o suspender el tratamiento con TAVALISSE de manera permanente si usted tiene efectos secundarios.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TAVALISSE?

Los efectos secundarios más comunes de TAVALISSE, incluyen:

- Náuseas
- Erupción cutánea
- Mareos
- Cansancio
- Infección respiratoria
- Dolor de pecho
- Dolor estomacal (abdominal)

Estos no son todos los efectos secundarios de TAVALISSE. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su médico para recibir asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Si desea informar sobre algún efecto secundario a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), llame al 1-800-FDA-1088.

## Control de la diarrea

Su proveedor de atención médica puede recomendarle lo siguiente:



**Mantenerse hidratado.** Para evitar la deshidratación, beba líquidos durante todo el día, como agua, electrolitos, té descafeinado y caldo claro. Incluso puede considerar paletas heladas, gelatina y trocitos de hielo para que haya variedad.



**Realizar cambios en su dieta.** Haga comidas frecuentes y pequeñas, y limite los alimentos de alto contenido de fibra (como nueces o semillas) o alimentos condimentados o grasosos.



**Tomar medicamentos.** Algunos medicamentos anti-diarréicos de venta libre pueden ayudar a proporcionar alivio. Su proveedor de atención médica puede darle recomendaciones específicas.

# Un equipo de apoyo dedicado para TAVALISSE



## RIGEL ONECARE puede ayudarlo a comenzar y a mantenerse bien encaminado con su tratamiento.

### RIGEL ONECARE puede ayudarlo a tener un comienzo sin inconvenientes con TAVALISSE al:

- **Coordinar** con su plan de seguro y su proveedor de atención médica para determinar la cobertura
- **Determinar** la elegibilidad y facilitar la inscripción en los programas de asistencia económica y para copagos
- **Comunicarse** con usted para responder preguntas y prepararlo para comenzar a tomar TAVALISSE



Personal de enfermería para asistirlo con el proceso



Especialistas en reembolsos



Asistencia económica y para copagos



Materiales educativos

### RIGEL ONECARE puede ayudarlo a mantenerse al día con el plan de su proveedor de atención médica de las siguientes maneras:

- **Trabajando** con usted durante las primeras semanas de su tratamiento para brindarle cualquier apoyo adicional
- **Al estar disponible** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. hora del este para responder sus preguntas

## Pague tan solo \$15 por receta con la asistencia para copagos para TAVALISSE

### Elegibilidad y limitaciones:

Los pacientes elegibles podrán recibir TAVALISSE con un copago de \$15 por cada receta, si pagan a través de un seguro comercial.

- Los pacientes deben tener una receta válida de TAVALISSE y un seguro comercial
- Los pacientes deben tener 18 años de edad o más
- Esta oferta no es válida para recetas reembolsadas por Medicare, Medicaid, TriCare o cualquier otro programa federal o estatal, o cuando la ley lo prohíba

- El paciente será responsable de cualquier gasto de bolsillo después del límite anual de \$15,000
- Esta oferta no es un seguro y es válida solo para recetas que se surtan en los Estados Unidos y Puerto Rico
- No es válida para pacientes que paguen en efectivo
- Rigel se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar este programa sin previo aviso
- Se pueden aplicar otras restricciones. Los pacientes son responsables de cualquier impuesto aplicable, si lo hubiere

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.



### Para inscribirse:

- Visite [TAVALISSEcopay.com](https://www.tavalisse.com)
- Complete y envíe su información para determinar si es elegible
- Imprima la tarjeta de copagos y téngala a mano cuando hable con la farmacia especializada

Inscríbase en RIGEL ONECARE.

Para comenzar, llame al 1-833-rigelOC (833-744-3562) o 650-449-8646, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. hora del este.



# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

## ¿Qué es TAVALISSE?

TAVALISSE es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con recuentos bajos de plaquetas a causa de la PTI crónica cuando un tratamiento anterior para la PTI no ha funcionado lo suficientemente bien. Se desconoce si TAVALISSE es seguro y eficaz en niños.

## ¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de TAVALISSE?

### TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La aparición de presión arterial alta, o el empeoramiento de la ya existente, es común en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial con regularidad durante el tratamiento con TAVALISSE. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede ponerle tratamiento con medicamentos para la presión arterial o cambiar sus medicamentos actuales para tratar la presión arterial. Hable con su proveedor de atención médica si tiene dolores de cabeza, confusión, mareos, dolor de pecho o falta de aliento.
- **Problemas hepáticos.** Los cambios en los resultados de análisis de sangre para verificar la función hepática son comunes con TAVALISSE. Es posible que se manifiesten problemas hepáticos, los cuales pueden ser graves. Durante el tratamiento con TAVALISSE, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para verificar el funcionamiento del hígado.

- **Diarrea.** La diarrea es común en las personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Hable con su proveedor de atención médica si tiene diarrea durante el tratamiento con TAVALISSE. Su proveedor de atención médica puede recomendarle cambios en la dieta, beber más agua o medicamentos para limitar estos síntomas.
- **Disminuciones en el recuento de glóbulos blancos (neutropenia).** Las disminuciones en el recuento de glóbulos blancos son comunes con TAVALISSE y pueden ser graves. Esto puede aumentar el riesgo de infección, incluidas infecciones graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre con regularidad para verificar los recuentos de glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis, interrumpirla temporalmente o suspender el tratamiento con TAVALISSE de manera permanente si usted tiene efectos secundarios.

## Antes de tomar TAVALISSE, hable con su proveedor de atención médica sobre sus problemas médicos, incluido si usted:

- tiene presión arterial alta
- tiene problemas hepáticos
- está embarazada o planea quedar embarazada. TAVALISSE puede dañar a su bebé en gestación.
  - Su proveedor de atención médica comprobará si usted está embarazada antes de comenzar el tratamiento con TAVALISSE.
  - Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con TAVALISSE y durante al menos 1 mes después de la última dosis.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que use,** incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados medicamentos puede afectar el funcionamiento de TAVALISSE y el de los otros medicamentos.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TAVALISSE?

Los efectos secundarios más comunes de TAVALISSE incluyen:

- Náuseas, erupción cutánea, mareos, cansancio, infección respiratoria, dolor de pecho y dolor estomacal (abdominal).

Estos no son todos los efectos secundarios de TAVALISSE. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su médico para recibir asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Si desea informar sobre algún efecto secundario a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

# Una manera distinta de tratar la PTI crónica en adultos

Elevar los recuentos de plaquetas y mantenerlos en el nivel adecuado puede resultar un desafío. Para los adultos que viven con PTI crónica, TAVALISSE podría ser el tratamiento adecuado.

## RESULTADOS TEMPRANOS

Aumento en los recuentos de plaquetas observado en tan solo 2 semanas en muchos pacientes

## SE ADECUA A SU ESTILO DE VIDA

El beneficio de un medicamento por vía oral que se puede tomar con o sin alimentos

## TRATAMIENTO DIRIGIDO

Funciona de una manera distinta para limitar la destrucción de plaquetas y aumentar los niveles de plaquetas con el tiempo

*Comience a controlar su PTI crónica hoy.  
Hable con su médico acerca de comenzar a tomar TAVALISSE.*

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TAVALISSE?

Los efectos secundarios más comunes de TAVALISSE incluyen:

- Náuseas, erupción cutánea, mareos, cansancio, infección respiratoria, dolor de pecho y dolor estomacal (abdominal).

Consulte la Información de seguridad Importante en las páginas 16 y 17 y la Información de prescripción completa adjunta.



© 2019 Rigel Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. TAVA\_ITP-19096 0519  
TAVALISSE y RIGEL ONECARE son marcas comerciales de Rigel Pharmaceuticals, Inc.  
RIGEL ONECARE es un centro de apoyo al paciente, patrocinado por Rigel Pharmaceuticals, Inc.

 **Tavalisse**<sup>™</sup>  
(fostamatinib disodium hexahydrate) tablets

[TAVALISSE.com](https://www.tavalisse.com)